

PRODUKTINFORMATION

FROWEIN GMBH & CO. KG

JuvenEX EC

Verwendung

Bekämpfung von Schaben, Flöhen und Fliegen. Anwendung auch im Wohn- und Lebensmittelbereich.

Typ

Emulsionskonzentrat (EC). Zur Wasserverdünnung.

Wirkstoffe

Pyriproxyfen (10,0 g/l), Pyrethrum-Extrakt 25 % (276,0 g/l), Piperonylbutoxid (552,0 g/l).

Enthält aliphatisches Kohlenwasserstoffgemisch.

Enthält Destillate (Erdöl).

Wirkung

JuvenEX EC wirkt nach Kontakt der Schädlinge mit den Sprühtröpfen und dem Flächenbelag.

Das lichtstabile, langwirkende Juvenoid Pyriproxyfen stört den Hormonhaushalt der Insekten. Es verhindert die Metamorphose und führt zu Sterilität, d. h. zur allmählichen Tilgung der Population. Der kurzlebige, natürliche Wirkstoff Pyrethrum bringt rasche Sofortwirkung.

Besonderheiten

- Langzeitwirkung auf neue Art (Juvenilhormon-Analog) mit hoher Sicherheit für Mensch und Haustier.
- Spontane Sofortwirkung durch Kombination mit Natur-Pyrethrum.
- Resistenzbrechend und resistenzverhürend.
- Lösungsmittelarm.
- Auch für sensible Bereiche geeignet, d. h. Wohnungen, Schulen, Büroräume, Krankenzimmer, Großküchen, Lebensmittelbetriebe etc.

Bedarf

Bei Flöhen wird eine 2%ige, bei Schaben eine 3%ige Wasserverdünnung empfohlen. Für 5 Liter Präparat werden also 100 ml bzw. 150 ml des Konzentrates benötigt. (Bei Packungen mit Dosierzvorrichtung: 4 bzw. 6 Dosierkammerfüllungen à 25 ml.

Zur Entnahme roten Schraubverschluß lockern. Flasche langsam drücken, bis Dosierkammer randvoll ist. Evtl. Überschuss läuft zurück.)

Je nach Flächenbeschaffenheit werden 15 - 100 ml anwendungsfertiges Präparat je m² benötigt. Das Präparat soll von den behandelten Flächen nicht ablaufen.

2%ig bei Fliegen mit Wasser verdünnen. Je nach Flächenbeschaffenheit werden 20 – 50 ml anwendungsfertiges Präparat je m² benötigt. Bei starkem Befall sollte die Dosierung auf 4 % erhöht werden. Die Anwendung sollte je nach Befall und Dosierung im vier- bis sechswöchigen Rhythmus wiederholt werden.

Anwendung

Potentielle Verstecke der Schädlinge wo möglich freilegen. Alle befallenen, belauften und verdächtigen Stellen sowie deren Umgebung direkt besprühen. Zur Ausbringung geeignet ist der SprayBOSS von „808“ oder ähnliche Drucksprühgeräte. Druck max. 2 bar. Anwendungsfertiges Präparat innerhalb 24 Std. aufbrauchen.

Kontrolle

Vor jeder Schädlingsbekämpfung ist eine Erhebung über Art und Ausmaß des Schädlingsbefalls zweckmäßig. Geeignete Hilfsmittel hierfür sind Klebefallen (z. B. Detektiv S).

Schaben

Schaben bevorzugen dunkle Verstecke in der Nähe von Wasser und Nahrung. Die moderne Bautechnik schafft eine Vielzahl idealer Biotope wie z. B. Einbaumöbel, Dämmplatten, Isoliermaterial, abgehängte Decken, Verkleidungen, Installationsschächte usw. Für die nötige Wärme sorgen Zentralheizungen, Bäder, Spülmaschinen, Kühlaggregate, Trockner, Backöfen, Boiler etc.

BIOZIDE



Bekämpfungen bei Deutschen Schaben nach spätestens 3 Wochen, bei Orientalischen Schaben und anderen großen Arten nach 10 bis 12 Wochen wiederholen.

Flöhe

Vor der Anwendung Fußböden, Teppiche, Polstermöbel o. ä. absaugen. Ecken und Randbereiche besonders beachten. Staubsaugerbeutel in Plastikbeuteln luftdicht verschließen und bald beseitigen.

Bevorzugte Aufenthaltsorte wie z. B. Schlaf- und Liegeplätze von Heimtieren besonders beachten.

Bekämpfung nach 2 bis 4 Wochen wiederholen. Befallene Heimtiere vom Tierarzt behandeln lassen.

Fliegen

Siehe Technische Information „Fliegenbekämpfung in landwirtschaftlichen Gebäuden mit JuvenEX EC“.

Vorsichtsmaßnahmen

Entzündlich. Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Reizt die Augen. Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Aerosol nicht einatmen. Nur nach Gebrauchsanweisung anwenden. Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Mißbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.

Personen außer dem Anwender verlassen den Raum. Alle nicht mittelsicher verpackten Lebens- und Futtermittel, Nutz- und Heimtiere sowie Spielzeug, offenes Geschirr u. a. Bedarfsgegenstände vor der Anwendung entfernen. Aquarien und Terrarien mittelsicher abdecken. Kochgeräte, Tische, Arbeitsplatten etc. mittelsicher abdecken oder vor Gebrauch mit einem alkalischen Spül- bzw. Reinigungsmittel abwaschen bzw. reinigen.

Kontakt mit frischen, feuchten Sprühbelägen vermeiden. Kinder und Heimtiere fernhalten.

Nicht auf ungeschützte elektrische Geräte/Schalter sprühen.

Räume vor Benutzung lüften (bis Sprühbelag vollständig abgetrocknet ist).

Packung dicht verschlossen und kühl lagern. Mittel und dessen Reste nicht in Gewässer gelangen lassen.

Entsorgung

Anfallende Mittelreste und Verpackungen mit Restinhalt gemäß den abfallrechtlichen Regelungen als Sonderabfall entsorgen. Restentleerte Verpackungen sind gemäß Anhang I der VerpackV einer Verwertung zuzuführen.

Verpackung

Plastik-Dosierflasche mit 500 ml.

Plastikkanister mit 5 Liter.

BIOZIDE



FROWEIN GMBH & CO. KG

D-72437 Albstadt, Postfach 201440

D-72461 Albstadt, Am Reisbach 83

Tel. +49 7432 956-0 · Fax +49 7432 956-138

www.frowein808.de · eMail: info@frowein808.de